

Alliance pancanadienne pharmaceutique : aucune négociation APP

En date du 30 juin 2018

L'APP a décidé de **ne pas mener** de négociations collectives ou individuelles à l'échelle provinciale ou territoriale pour 59 produits pharmaceutiques :

| Produit pharmaceutique Novateur (Nom générique) | Indication/usage |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abilify (aripiprazole) | Utilisé pour le traitement des troubles dépressifs majeurs. |
| Adempas (riociguat)** | Utilisé pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. |
| Afinitor (évérolimus) | Utilisé pour le traitement de l'angiomyolipome rénal. |
| Afinitor (évérolimus) | Utilisé pour le traitement de l'astrocytome sous-épendymaire à cellules géantes associé à la sclérose tubéreuse de Bourneville. |
| Alecensaro (alectinib) | Utilisé pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules présentant des métastases non traitées au niveau du système nerveux central (SNC). |
| Aloxi (palonosétron) | Utilisé pour prévenir les nausées et les vomissements associés à la chimiothérapie. |
| Aloxi IV (palonosétron) | Utilisé pour prévenir les nausées et les vomissements associés à la chimiothérapie. |
| Aprilon (doxycycline) | Utilisé pour le traitement de la rosacée inflammatoire. |
| Arzerra (ofatumumab) | Utilisé pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique. |
| Benlysta (belimumab) | Utilisé pour le traitement du lupus. |
| Bystolic (nébivolol) | Utilisé pour le traitement de l'hypertension. |
| Constella (linaclotide) | Utilisé pour le traitement du syndrome du côlon irritable associé à une constipation. |
| Cortiment (budesonide) | Utilisé pour le traitement de la colite ulcéreuse. |
| Darzalex (daratumumab) | Utilisé pour le traitement du myélome multiple. |
| Dymista (azélastine/fluticasone) | Utilisé pour le traitement de la rhinite allergique saisonnière. |
| Edarbi (azilsartan) | Utilisé pour le traitement de l'hypertension. |
| Edarbyclor (azilsartan/chlorthalidone) | Utilisé pour le traitement de l'hypertension. |
| Egrifta (tésamoréline) | Utilisé pour le traitement de la lipodystrophie, chez les patients atteints du VIH. |
| Elelyso (taliglucérase alfa) | Utilisé pour le traitement de la maladie de Gaucher. |
| Erbix (cétuximab) | Utilisé en combinaison avec FOLFIRI pour le traitement en première ligne du cancer colorectal métastatique comportant le gène <i>KRAS</i> non muté (type sauvage). |
| Fampyra (fampiridine) | Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques. |
| Fentora (fentanyl buccal) | Utilisé pour le traitement des douleurs aiguës causées par le cancer. |
| Grastek (extrait allergénique standardisé de fléole des prés) | Utilisé pour le traitement de la rhinite allergique induite par les pollens de graminées. |
| Humira (adalimumab)** | Utilisé pour le traitement de l'hydrosadénite active. |
| Ilaris (canakinumab)** | Utilisé pour le traitement de l'arthrite idiopathique juvénile systémique. |
| Imbruvica (ibrutinib) | Utilisé pour le traitement de la macroglobulinémie de Waldenström. |
| Intuniv XR (chlorhydrate de guanfacine) | Utilisé pour le traitement de trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. |
| Jinarc (tolvaptan) | Utilisé pour le traitement de la maladie polykystique rénale autosomique dominante (MPRAD). |
| Juxtapid (lomitapide) | Utilisé pour le traitement d'hypercholestérolémie familiale homozygote. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lynparza (olaparib) | Utilisé pour le traitement du cancer de l'ovaire génito-urinaire. |
| Kazano (alogliptine/metformine) | Utilisé pour le traitement du diabète du type 2. |
| Nesina (alogliptine) | Utilisé pour le traitement du diabète du type 2. |
| Nexavar (sorafénib) | Utilisé pour le traitement du carcinome thyroïdien bien différencié et progressif. |
| Ninlaro (ixazomib) | Utilisé pour le traitement du myélome multiple. |
| Orkambi (lumacaftor/ivacaftor) | Utilisé pour le traitement de la fibrose kystique. |
| Otezla (aprémilast) | Utilisé pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère. |
| Perjeta (pertuzumab) | Utilisé pour le traitement du cancer du sein néo-adjuvant. |
| Perjeta-Herceptin Combo Pack (pertuzumab) | Utilisé pour le traitement du cancer du sein néo-adjuvant. |
| Picato (mébutate d'ingénol) | Utilisé pour le traitement de la kératose actinique. |
| Revolade (eltrombopag) | Utilisé pour le traitement de la thrombopoïétine chez les patients souffrant d'une infection chronique de l'hépatite C. |
| Rituxan (rituximab) | Utilisé pour le traitement de la leucémie lymphoblastique aigüe. |
| Samsca (tolvaptan) | Utilisé pour le traitement de l'hyponatrémie. |
| Signifor (pasiréotide) | Utilisé pour le traitement de la maladie de Cushing. |
| Stelara (ustekinumab) | Utilisé pour le traitement du rhumatisme psoriasique. |
| Stivarga (régorafénib) | Utilisé pour le traitement du cancer colorectal métastatique. |
| Sublinox (zolpidem) | Utilisé pour le traitement de l'insomnie grave. |
| Tafinlar (dabrafénib) et Mekinist (tramétinib) | Utilisé pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules. |
| Tykerb (lapatinib) | Utilisé conjointement avec le létrozole pour le traitement du cancer du sein métastatique. |
| Truvada (emtricitabine/fumarate de ténofovir disoproxil) | Utilisé pour le traitement de la prophylaxie pré-exposition de l'infection par le VIH. |
| Vectibix (panitumumab) | Utilisé pour le traitement du cancer colorectal gauche métastatique. |
| Viacoram (perindopril/amlodipine)** | Utilisé pour le traitement de l'hypertension. |
| Vimizim (élosulfase) | Utilisé pour le traitement de la mucopolysaccharidose de type IVA (MPS IVA). |
| Xiaflex (collagénase de clostridium histolyticum) | Utilisé pour le traitement de la maladie du Dupuytren. |
| Xgeva (denosumab)** | Utilisé pour le traitement des accidents liés au squelette dus à des métastases osseuses. |
| Yondelis (trabectédine) | Utilisé pour le traitement du liposarcome ou léiomyosarcome métastatique. |
| Zaltrap (aflibercept) | Utilisé pour le traitement du cancer colorectal métastatique. |
| Zinbryta (daclizumab bêta) | Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques. |
| Zydelig (idelalisib) | Utilisé pour le traitement du lymphome folliculaire. |
| Zykadia (ceritinib) | Utilisé pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) exprimant la kinase du lymphome anaplasique (ALK-positif). |

* Aucun nouveau produit pharmaceutique depuis la dernière mise à jour du 31 mai 2018.

** Les fabricants et les gouvernements participant à l'APP ont entamé des discussions approfondies au sujet des critères et des conditions, comme recommandé par l'ÉTS. Ils ont tous deux convenu qu'une déclaration d'intention ne peut être conclue à l'heure actuelle.

Chaque produit pharmaceutique est évalué individuellement en fonction de plusieurs facteurs, notamment les recommandations du Comité consultatif canadien d'expertise sur les médicaments (CCCEM) ou du pan-Canadian Oncology Drug Review Expert Review Committee (pERC), le point de vue des patients, les besoins et

considérations cliniques. La majorité des produits pour lesquels l'APP et les provinces et les territoires ne mèneront pas de négociations ont fait l'objet de recommandations défavorables du CCEM ou du pERC en raison d'inquiétudes cliniques tels qu'une incertitude quant aux avantages cliniques des produits concernés.

Si de nouvelles informations deviennent disponibles pour répondre aux préoccupations soulevées par l'APP et le comité de surveillance national applicable, l'APP peut reconsidérer sa décision.