

Alliance pancanadienne pharmaceutique : négociations actives

En date du 31 mars 2019

À l'heure actuelle, 44 négociations sont **en cours** pour les produits pharmaceutiques suivants :

Produit pharmaceutique Novateur (Nom générique)	Indication/usage
Adlyxine (lixisénatide)	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
Akynzeo (nétipitant/palonosétron)	Utilisé pour la prévention de nausées et vomissements induits par la chimiothérapie.
Biktarvy (bictégravir/emtricitabine/ténofovir/alafenamide)	Utilisé pour le traitement de l'infection par VIH.
Brineura (cerliponase alfa)*	Utilisé pour le traitement de lipofuscinoses ceroïdes neuronales de type 2.
Duodopa (levodopa/carbidopa)	Utilisé pour le traitement de la maladie de Parkinson.
Dupixent (dupilumab)	Utilisé pour le traitement de la dermatite atopique.
Ella (ulipristal acetate)	Utilisé pour la prévention de la grossesse.
Erleada (apalutamide)*	Utilisé pour le traitement du cancer de la prostate réfractaire à l'orchidectomie.
Fasenra (benralizumab)	Utilisé pour le traitement de l'asthme éosinophile.
Fibrystal (acétate d'ulipristal)	Utilisé pour le traitement intermittent des signes et symptômes modérés à sévères des fibromes utérins.
Fulphila (pegfilgastrim)	Utilisé pour le traitement de la neutropénie fébrile associée à un cancer non myéloïde.
Fycompa (pérampanel)	Utilisé pour le traitement de l'épilepsie généralisée primaire, se manifestant par des crises tonico-cloniques.
Herceptin SC (trastuzumab)	Utilisé pour le traitement des cancers du sein.
Humira (sans citrate) (adalimumab)	Utilisé pour plusieurs indications.
Januvia (sitagliptin)	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
Kalydeco (ivacaftor)*	Utilisé pour le traitement de la fibrose kystique chez les patients avec la mutation de CFTR ou la mutation de R117H.
Kanuma (sebelipase alfa)	Utilisé pour le traitement de la déficience en lipase acide lysosomal.
Keytruda (pembrolizumab)	Utilisé pour le traitement du carcinome urothélial métastatique.
Keytruda (pembrolizumab)	Utilisé pour le traitement du lymphome de Hodgkin classique.
Kisqali (ribociclib)	Utilisé pour le traitement du cancer du sein métastatique ou avancé.
Kuvan (dichlorhydrate de saproptérine)	Utilisé pour le traitement de la phénylcétonurie.
Mavenclad (cladribine)	Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques cyclique.
Monoprost (latanoprost)	Utilisé pour le traitement du glaucome et de l'hypertension oculaire.
Mvasi (bevacizumab)	Cancer colorectal métastatique/biosimilaire contre le cancer du poumon non à petites cellules.
Onivyde (irinotécan liposomal)	Utilisé pour le traitement du lymphome de Hodgkin.
Opdivo (nivolumab)	Utilisé pour le traitement du lymphome de Hodgkin classique.
Ozempic (sémaglutide)	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
Praluent (alirocumab)	Utilisé pour la prévention des événements cardiovasculaires chez les patients atteints de la maladie cardiovasculaire athéroscléreuse.
Prevymis (létermovir)	Utilisé pour la prévention de l'infection à cytomégalo virus.
Probuphine (buprénorphine)	Utilisé pour le traitement des troubles de l'usage d'opioïdes.

Repatha (évolocumab)	Utilisé pour la prévention des événements cardiovasculaires chez les patients atteints de la maladie cardiovasculaire athéroscléreuse.
Segluromet (ertugliflozin/metformine hydrochloride)*	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
Steglatro (ertugliflozine)*	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
Stivarga (regorafenib)	Utilisé pour le traitement du carcinome hépatocellulaire non résecable.
Symtuza (darunavir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir alafenamide)	Utilisé pour le traitement de l'infection par VIH.
Tagrisso (osimertinib)*	Utilisé pour le traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique.
Trelegy Ellipta (fluticasone furoate/umeclidinium/vilantérol)	Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique.
Tremfya (guselkumab)	Utilisé pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère.
Trulicity (dulaglutide)	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
Viacoram (perindopril arginine/amlodipine)	Utilisé pour le traitement de l'hypertension essentielle.
Xarelto (rivaroxaban)*	Utilisé pour la prévention d'événements cardiovasculaires causés par la coronopathie ou la maladie artérielle périphérique.
Xeljanz XR (tofacitinib)	Utilisé pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde.
Xolair (omalizumab)	Utilisé pour le traitement de l'asthme persistant grave.
Zirabev (bevacizumab)*	Utilisé pour le traitement du cancer colorectal métastatique et du cancer du poumon non à petites cellules.

* Nouveaux produits pharmaceutiques depuis la dernière mise à jour du 28 février 2019.