

## Alliance pancanadienne pharmaceutique : négociations terminées

En date du 31 mars 2018

207 négociations communes ont **pris fin\*\*** pour les médicaments et indications suivants :

| Produit pharmaceutique<br>Novateur (Nom générique)                      | Indication/usage<br><i>Veillez consulter les gouvernements individuels pour les critères de remboursement spécifiques</i>                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abilify Maintena (aripiprazole injection à action prolongée)</b>     | Utilisé pour le traitement d'entretien de la schizophrénie.                                                                                               |
| <b>Abraxane (nab-paclitaxel)</b>                                        | Utilisé pour le traitement de première ligne de l'adénocarcinome du pancréas localement avancé, non-résécable (inopérable) ou métastatique.               |
| <b>Actemra (tocilizumab) SC</b>                                         | Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.                                                                                                 |
| <b>Adcetris (brentuximab)</b>                                           | Utilisé pour le traitement du lymphome.                                                                                                                   |
| <b>Adempas (riociguat)</b>                                              | Utilisé pour le traitement de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique.                                                                       |
| <b>Advair (xinafoate de salmétérol/propionate de fluticasone)</b>       | Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique et de l'asthme.                                                                 |
| <b>Afinitor (évérolimus)</b>                                            | Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas et dans le traitement du cancer du sein.                                               |
| <b>Afinitor (évérolimus)</b>                                            | Utilisé pour le traitement des tumeurs neuroendocrines d'origine gastro-intestinale ou pulmonaire.                                                        |
| <b>Alimta (pemetrexed)</b>                                              | Utilisé pour le traitement du cancer du poumon (nouvelle indication).                                                                                     |
| <b>Anoro Ellipta (bromure d'uméclidinium/trifénatate de vilantérol)</b> | Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique.                                                                                |
| <b>Aptiom (eslicarbazépine)</b>                                         | Utilisé pour le traitement des crises épileptiques.                                                                                                       |
| <b>Arnuity Ellipta (fluorate de fluticasone)</b>                        | Utilisé pour le traitement de l'asthme.                                                                                                                   |
| <b>Aubagio (tériflunomide)</b>                                          | Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques rémittente (SEP rémittente).                                                                         |
| <b>Avastin (bevacizumab)</b>                                            | Utilisé pour le traitement du cancer du col de l'utérus persistant, récidivant, ou métastatique. Utilisé pour le traitement du cancer ovarien épithélial. |
| <b>Avastin (bevacizumab)</b>                                            | Utilisé pour le traitement du cancer des ovaires génito-urinaire résistant à la platine.                                                                  |
| <b>Avastin (bevacizumab)</b>                                            | Utilisé pour le traitement du cancer colorectal métastatique.                                                                                             |
| <b>Basaglar (insuline glargine)</b>                                     | Utilisé pour le traitement du diabète des types 1 et 2.                                                                                                   |
| <b>Blincyto (blinatumomab)</b>                                          | Utilisé pour le traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique.                                                                                          |
| <b>Bosulif (bosutinib)</b>                                              | Utilisé pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC).                                                                                       |
| <b>Botox (onabotulinumtoxin A)</b>                                      | Utilisé pour le traitement de multiples indications.                                                                                                      |
| <b>Brenzys (étanercept)</b>                                             | Utilisé pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante.                                                                    |
| <b>Breo Ellipta (furoate de fluticasone et vilantérol)</b>              | Utilisé pour le traitement de l'asthme.                                                                                                                   |
| <b>Breo Ellipta (furoate de fluticasone et vilantérol)</b>              | Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique.                                                                                |
| <b>Brilinta (ticagrélor)<sup>†</sup></b>                                | Utilisé avec l'AAS pour la prévention des accidents athérombotiques chez les patients aux prises avec un syndrome coronarien aigu.                        |
| <b>Cimzia (certolizumab)</b>                                            | Utilisé pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante, l'arthrite psoriasique.                                                                     |
| <b>Cosentyx (sécukinumab)</b>                                           | Utilisé pour le traitement du psoriasis en plaques modéré ou grave.                                                                                       |
| <b>Cosentyx (sécukinumab)</b>                                           | Utilisé pour le traitement de la polyarthrite psoriasique.                                                                                                |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosentyx (sécukinumab)</b>                                                    | Utilisé pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante.                                                                                                                                                        |
| <b>Cotellic (cobimétinib)</b>                                                    | Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique.                                                                                                                                                                 |
| <b>Cyramza (ramucirumab)</b>                                                     | Utilisé pour le traitement du cancer de l'estomac métastatique gastro-intestinal ou d'un adénocarcinome de la jonction gastro-œsophagienne.                                                                          |
| <b>Daklinza (daclatasvir)</b>                                                    | Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique.                                                                                                                                                 |
| <b>Diacomit (stiripentol)</b>                                                    | Utilisé chez les patients atteints d'une épilepsie myoclonique sévère du nourrisson.                                                                                                                                 |
| <b>Dificid (fidaxomicine)</b>                                                    | Utilisé pour le traitement du <i>Clostridium difficile</i> .                                                                                                                                                         |
| <b>Duaklir Genuair (bromure d'aclidinium/fumarate de formotérol dihydraté)</b>   | Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).                                                                                                                                    |
| <b>Effient (prasugrel)</b>                                                       | Utilisé avec l'AAS pour la prévention des accidents athérothrombotiques chez les patients aux prises avec un syndrome coronarien aigu.                                                                               |
| <b>Eliquis (apixaban)</b>                                                        | Utilisé pour la prévention de l'AVC chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire et pour la prévention de la thrombose veineuse profonde.                                                                 |
| <b>Eliquis (apixaban)</b>                                                        | Utilisé pour le traitement des événements thromboemboliques veineux et pour prévenir la récurrence de la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire.                                                        |
| <b>Entresto (sacubitril/valsartan)</b>                                           | Utilisé pour le traitement de l'insuffisance cardiaque.                                                                                                                                                              |
| <b>Entyvio (védolizumab)</b>                                                     | Utilisé pour le traitement de la colite ulcéreuse.                                                                                                                                                                   |
| <b>Entyvio (védolizumab)</b>                                                     | Utilisé pour le traitement de la maladie de Crohn.                                                                                                                                                                   |
| <b>Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir)</b>                                          | Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique.                                                                                                                                                 |
| <b>Erelzi (étanercept)</b>                                                       | Utilisé pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante, de la polyarthrite idiopathique juvénile, et l'arthrite rhumatoïde.                                                                                    |
| <b>Erivedge (vismodegib)</b>                                                     | Utilisé pour le traitement du carcinome basocellulaire métastatique.                                                                                                                                                 |
| <b>Esbriet (pirfénidone)</b>                                                     | Utilisé pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique.                                                                                                                                                    |
| <b>Esbriet (pirfénidone)<br/>(deuxième lettre d'intention)</b>                   | Utilisé pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique.                                                                                                                                                    |
| <b>Eylea (aflibercept)</b>                                                       | Utilisé pour le traitement de la forme humide de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de l'œdème maculaire diabétique, et/ou de l'œdème maculaire consécutif à une occlusion de la veine centrale de la rétine. |
| <b>Eylea (aflibercept)</b>                                                       | Utilisé pour le traitement de l'œdème maculaire consécutif à une occlusion d'une branche de l'artère rétinienne.                                                                                                     |
| <b>Fabrazyme (agalsidase bêta)</b>                                               | Utilisé pour le traitement de la maladie de Fabry.                                                                                                                                                                   |
| <b>Fabrazyme (agalsidase bêta)<br/>(deuxième lettre d'intention)</b>             | Utilisé pour le traitement de la maladie de Fabry.                                                                                                                                                                   |
| <b>Ferriprox (défériprone)</b>                                                   | Utilisé pour le traitement de la surcharge en fer post-transfusionnelle.                                                                                                                                             |
| <b>Fibrystal (acétate d'ulipristal)</b>                                          | Utilisé pour le traitement des fibromes utérins.                                                                                                                                                                     |
| <b>Firazyr (icatibant)</b>                                                       | Utilisé pour le traitement des crises aiguës d'angio-œdème héréditaire.                                                                                                                                              |
| <b>Forxiga (dapagliflozine)</b>                                                  | Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.                                                                                                                                                                     |
| <b>Galexos (siméprévir)</b>                                                      | Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique de génotype 1.                                                                                                                                   |
| <b>Gazyva (obinutuzumab)</b>                                                     | Utilisé pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique.                                                                                                                                                       |
| <b>Gazyva (obinutuzumab)</b>                                                     | Utilisé pour le traitement du lymphome folliculaire.                                                                                                                                                                 |
| <b>Genvoya<br/>(elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir/alafénamide)</b> | Utilisé pour le traitement de l'infection de VIH-1.                                                                                                                                                                  |
| <b>Gilenya (fingolimod)<sup>†</sup></b>                                          | Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques rémittente (SEP rémittente).                                                                                                                                    |
| <b>Giotrif (afatinib)</b>                                                        | Utilisé pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules avancé.                                                                                                                                        |
| <b>Giotrif (afatinib)<br/>(deuxième lettre d'intention)</b>                      | Utilisé pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules avancé.                                                                                                                                        |
| <b>Glatect (acétate de glatiramère)*</b>                                         | Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques de type récurrente/rémittente.                                                                                                                                  |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grastofil (filgrastim)</b>                                                | Utilisé pour la prévention ou le traitement de la neutropénie dans diverses indications.                                                                                                     |
| <b>Halaven (éribuline)</b>                                                   | Utilisé pour le traitement du cancer du sein.                                                                                                                                                |
| <b>Harvoni (sofosbuvir/lédipasvir)</b>                                       | Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique.                                                                                                                         |
| <b>Harvoni (sofosbuvir/lédipasvir)<br/>(deuxième lettre d'intention)</b>     | Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique.                                                                                                                         |
| <b>Holkira Pak<br/>(ombitasvir/paritaprévir/<br/>ritonavir et dasabuvir)</b> | Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique.                                                                                                                         |
| <b>Humira (adalimumab)</b>                                                   | Utilisé pour le traitement de la colite ulcéreuse.                                                                                                                                           |
| <b>Humira (adalimumab)</b>                                                   | Utilisé pour le traitement de l'hydrosadénite suppurée.                                                                                                                                      |
| <b>Ibavyr (ribavirine)</b>                                                   | Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique.                                                                                                                         |
| <b>Ibrance (palbociclib)</b>                                                 | Utilisé pour le traitement du cancer du sein avancé.                                                                                                                                         |
| <b>Iclusig (ponatinib)</b>                                                   | Utilisé pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC)/leucémie aiguë lymphoblastique.                                                                                           |
| <b>Imbruvica (ibrutinib)</b>                                                 | Utilisé pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique ou le lymphome lymphocytaire à petites cellules.                                                                               |
| <b>Imbruvica (ibrutinib)</b>                                                 | Utilisé pour le traitement lymphome à cellules du manteau en rechute ou réfractaire.                                                                                                         |
| <b>Imbruvica (ibrutinib)</b>                                                 | Utilisé pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique et du petit lymphome lymphocytaire.                                                                                            |
| <b>Incruse Ellipta (umécliclidinium)</b>                                     | Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).                                                                                                            |
| <b>Inflectra (infliximab)</b>                                                | Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'arthrite psoriasique, du psoriasis en plaques.                                             |
| <b>Inflectra (infliximab)</b>                                                | Utilisé pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante, du psoriasis en plaques, de l'arthrite psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse. |
| <b>Inlyta (axitinib)</b>                                                     | Utilisé pour le traitement du carcinome métastatique des cellules rénales.                                                                                                                   |
| <b>Inspiolto Respiat<br/>(tiotropium/olodatérol)</b>                         | Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).                                                                                                            |
| <b>Inspra (éplérénone)</b>                                                   | Utilisé pour le traitement d'insuffisance cardiaque systolique de classe II selon la New York Heart Association (NYHA).                                                                      |
| <b>Invega Trinza (palmitate de<br/>palipéridone)</b>                         | Utilisé pour le traitement de la schizophrénie.                                                                                                                                              |
| <b>Invokana (canagliflozine)</b>                                             | Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.                                                                                                                                             |
| <b>Istodax (romidepsine)</b>                                                 | Utilisé pour le traitement du lymphome T périphérique en rechute ou réfractaire.                                                                                                             |
| <b>Jadenu (déférasirox)</b>                                                  | Utilisé pour le traitement de la surcharge en fer chronique.                                                                                                                                 |
| <b>Jakavi (ruxolitinib)</b>                                                  | Utilisé pour le traitement de la myélofibrose à risque intermédiaire ou élevé.                                                                                                               |
| <b>Jakavi (ruxolitinib)</b>                                                  | Utilisé pour le traitement de la polyglobulie primitive.                                                                                                                                     |
| <b>Janumet<br/>(sitagliptine/metformine)</b>                                 | Utilisé pour le traitement du diabète de type 2 mellitus.                                                                                                                                    |
| <b>Januvia (sitagliptine)</b>                                                | Utilisé pour le traitement du diabète de type 2 mellitus.                                                                                                                                    |
| <b>Jardiance (empagliflozine)</b>                                            | Utilisé pour le traitement du diabète de type 2 mellitus.                                                                                                                                    |
| <b>Jetrea (ocriplasmine)</b>                                                 | Utilisé pour le traitement de la traction vitréomaculaire symptomatique.                                                                                                                     |
| <b>Kadcyla (trastuzumab<br/>emtansine)</b>                                   | Utilisé pour le traitement du cancer du sein métastatique de HER-2 positif.                                                                                                                  |
| <b>Kalydeco (ivacaftor)</b>                                                  | Utilisé pour le traitement de la fibrose kystique.                                                                                                                                           |
| <b>Keytruda (pembrolizumab)</b>                                              | Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique.                                                                                                                                         |
| <b>Keytruda (pembrolizumab)</b>                                              | Utilisé pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (deuxième ligne ou plus).                                                                                              |

|                                                             |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keytruda (pembrolizumab)</b>                             | Utilisé pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (première ligne).                                                                              |
| <b>Kuvan (saproptérine)†</b>                                | Utilisé pour le traitement de la phénylcétonurie.                                                                                                                    |
| <b>Kyprolis (carfilzomib)</b>                               | Utilisé pour le traitement du myélome multiple.                                                                                                                      |
| <b>Kyprolis (carfilzomib)</b>                               | Utilisé pour le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire.                                                                                            |
| <b>Lemtrada (alemtuzumab)</b>                               | Utilisé pour le traitement de la SP (poussée-rémission).                                                                                                             |
| <b>Lenvima (lenvatinib)</b>                                 | Utilisé pour le traitement du cancer de la thyroïde.                                                                                                                 |
| <b>Lodalys (colesevelam)</b>                                | Utilisé pour le traitement de l'hypercholestérolémie.                                                                                                                |
| <b>Mekinist (tramétinib)</b>                                | Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique.                                                                                                                 |
| <b>Metadol-D (chlorhydrate de méthadone)</b>                | Utilisé pour le traitement de la dépendance aux opioïdes.                                                                                                            |
| <b>Metoject (méthotrexate)</b>                              | Utilisé pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde.                                                                                                                 |
| <b>Mictoryl (propivéline)</b>                               | Utilisé pour le traitement de l'hyperactivité vésicale (en pédiatrie).                                                                                               |
| <b>Mifegymiso (mifépristone/misoprostol)</b>                | Utilisé pour l'interruption médicale de grossesse.                                                                                                                   |
| <b>Mozobil (plérixafor)</b>                                 | Utilisé conjointement avec le <i>facteur de stimulation des colonies de granulocytes</i> en soutien au traitement du lymphome non hodgkinien et du myélome multiple. |
| <b>Mozobil (plérixafor) (deuxième lettre d'intention)</b>   | Utilisé conjointement avec le <i>facteur de stimulation des colonies de granulocytes</i> en soutien au traitement du lymphome non hodgkinien et du myélome multiple. |
| <b>Myrbetriq (mirabegron)</b>                               | Utilisé pour le traitement de la vessie hyperactive.                                                                                                                 |
| <b>Narcan (chlorhydrate de naloxone)</b>                    | Utilisé pour le traitement de surdose d'opioïdes.                                                                                                                    |
| <b>Neupro (rotigotine)</b>                                  | Utilisé pour le traitement de la maladie de Parkinson.                                                                                                               |
| <b>Nucala (mépolizumab)</b>                                 | Utilisé pour le traitement de l'asthme éosinophile sévère.                                                                                                           |
| <b>Ofev (nintédanib)</b>                                    | Utilisé pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique.                                                                                                    |
| <b>Onbrez (indacatérol)†</b>                                | Utilisé comme bronchodilatateur pour la maladie pulmonaire obstructive chronique.                                                                                    |
| <b>Onglyza (saxagliptine)</b>                               | Utilisé pour le traitement du diabète de type 2 mellitus.                                                                                                            |
| <b>Opdivo (nivolumab)</b>                                   | Utilisé pour le traitement de la forme avancée ou métastatique du cancer du poumon non à petites cellules.                                                           |
| <b>Opdivo (nivolumab)</b>                                   | Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique.                                                                                                                 |
| <b>Opdivo (nivolumab)</b>                                   | Utilisé pour le traitement du carcinome rénal métastatique.                                                                                                          |
| <b>Opdivo (nivolumab)</b>                                   | Utilisé pour le traitement des carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou.                                                                                         |
| <b>Oralair (l'extrait d'allergène du pollen de l'herbe)</b> | Utilisé pour le traitement de la rhinite allergique avec ou sans conjonctivite.                                                                                      |
| <b>Orencia (abatacept)</b>                                  | Utilisé pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde.                                                                                                                 |
| <b>Perjeta (pertuzumab)</b>                                 | Utilisé pour le traitement du cancer du sein.                                                                                                                        |
| <b>Pheburane (sodium de phénylbutyrate)</b>                 | Utilisé pour le traitement des anomalies du cycle de l'urée.                                                                                                         |
| <b>Plegridy (PegIFN bêta-1a)</b>                            | Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques rémittente (SEP rémittente).                                                                                    |
| <b>Pomalyst (pomalidomide)</b>                              | Utilisé pour le traitement du myélome multiple.                                                                                                                      |
| <b>Pradaxa (dabigatran)†</b>                                | Utilisé pour la prévention de l'AVC chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire.                                                                         |
| <b>Prezcobix (darunavir/cobicistat)</b>                     | Utilisé pour le traitement de l'infection de VIH-1.                                                                                                                  |
| <b>Prolia (denosumab)</b>                                   | Utilisé pour le traitement de l'ostéoporose.                                                                                                                         |
| <b>Ravicti (phénylbutyrate de glycérol)</b>                 | Utilisé pour le traitement des anomalies du cycle de l'urée.                                                                                                         |
| <b>Rebif (interféron bêta-1a)</b>                           | Utilisé pour le syndrome clinique isolé.                                                                                                                             |

|                                                                                 |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Remicade (infliximab)</b>                                                    | Utilisé pour le traitement de multiples indications, incluant la polyarthrite rhumatoïde, la colite ulcéreuse, et la maladie de Crohn.       |
| <b>Repatha (évolocumab)</b>                                                     | Utilisé pour le traitement de l'hyperlipidémie primaire et la dyslipidémie mixte.                                                            |
| <b>Replagal (agalsidase alfa)</b>                                               | Utilisé pour le traitement de la maladie de Fabry.                                                                                           |
| <b>Replagal (agalsidase alfa)<br/>(deuxième lettre d'intention)</b>             | Utilisé pour le traitement de la maladie de Fabry.                                                                                           |
| <b>Revlimid (lénalidomide)</b>                                                  | Utilisé comme traitement de maintien dans les cas de myélome multiple après une transplantation de cellules souches.                         |
| <b>Revlimid (lénalidomide)</b>                                                  | Utilisé pour le traitement du myélome multiple nouvellement diagnostiqué.                                                                    |
| <b>Rituxan SC (rituximab)</b>                                                   | Utilisé pour le traitement de multiples indications.                                                                                         |
| <b>Seebri Breezhaler<br/>(bromure de glycopyrronium)</b>                        | Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique.                                                                   |
| <b>Simbrinza<br/>(brinzolamide/brimonidine)</b>                                 | Utilisé pour le traitement du glaucome et de l'hypertension oculaire.                                                                        |
| <b>Simponi (golimumab) SC</b>                                                   | Utilisé pour le traitement de la colite ulcéreuse.                                                                                           |
| <b>Soliris (éculizumab)<sup>†</sup></b>                                         | Utilisé pour le traitement de la maladie d'hémoglobinurie paroxystique nocturne.                                                             |
| <b>Sovaldi (sofosbuvir)</b>                                                     | Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique.                                                                         |
| <b>Sovaldi (sofosbuvir)<br/>(deuxième lettre d'intention)</b>                   | Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique.                                                                         |
| <b>Spiriva Respimat (tiotropium)</b>                                            | Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique.                                                                   |
| <b>Stivarga (régorafénib)</b>                                                   | Utilisé pour le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales non-résécables (inopérables) et/ou métastatiques.                       |
| <b>Stivarga (régorafénib)<br/>(deuxième lettre d'intention)</b>                 | Utilisé pour le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales non-résécables (inopérables) et/ou métastatiques.                       |
| <b>Strensiq (asfotase alfa)</b>                                                 | Utilisé pour le traitement de l'hypophosphatasie survenue pendant l'enfance.                                                                 |
| <b>Stribild (elvitégravir/cobicistat/<br/>emtricitabine/ténofovir)</b>          | Utilisé pour le traitement de l'infection au VIH-1 chez les adultes n'ayant jamais reçu d'antirétroviraux.                                   |
| <b>Sunvepra (asunaprévir)</b>                                                   | Utilisé pour le traitement de l'hépatite C chronique.                                                                                        |
| <b>Sutent (sunitinib)</b>                                                       | Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas.                                                                          |
| <b>Sylvant (siltuximab)</b>                                                     | Utilisé pour le traitement de la maladie de Castleman multicentrique.                                                                        |
| <b>Tafinlar (darafénib)</b>                                                     | Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique.                                                                                         |
| <b>Tafinlar (dabrafénib) et Mekinist<br/>(tramétinib)</b>                       | Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique (en combinaison).                                                                        |
| <b>Taltz (ixékizumab)</b>                                                       | Utilisé pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère.                                                                          |
| <b>Tecfidera (fumarate de<br/>diméthyle)</b>                                    | Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques.                                                                                        |
| <b>Tivicay (dolutégravir)</b>                                                   | Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1.                                                                                             |
| <b>Tobi Podhaler (tobramycine)</b>                                              | Utilisé pour la gestion des patients atteints de fibrose kystique ayant une infection pulmonaire chronique à <i>Pseudomonas aeruginosa</i> . |
| <b>Tradjenta (linagliptine) et<br/>Jentadueto<br/>(linagliptine/metformine)</b> | Utilisé pour le traitement du diabète de type 2 mellitus.                                                                                    |
| <b>Treanda (bendamustine)<sup>†</sup></b>                                       | Utilisé pour le traitement du lymphome non hodgkinien, du lymphome du manteau et de la leucémie lymphoïde chronique.                         |
| <b>Triumeq (dolutégravir/abacavir/<br/>lamivudine)</b>                          | Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1.                                                                                             |
| <b>Tudorza Genuair (Bromure<br/>d'aclidinium)</b>                               | Utilisé pour la gestion de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).                                                               |
| <b>Tysabri (natalizumab)</b>                                                    | Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques rémittente (SEP rémittente).                                                            |



|                                                           |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ultibro (indacatérol/ glycopyrronium)</b>              | Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique.                                                                                           |
| <b>Uptravi (séléxipag)</b>                                | Utilisé pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.                                                                                                  |
| <b>Valtrex (valacyclovir)</b>                             | Utilisé pour le traitement d'infections virales spécifiques.                                                                                                         |
| <b>Vectibix (panitumumab)</b>                             | Utilisé pour le traitement du cancer colorectal métastatique.                                                                                                        |
| <b>Vosevi (sofosbuvir velpatasvir voxilaprévir)</b>       | Utilisé pour le traitement des infections liées à l'hépatite C chronique.                                                                                            |
| <b>Votrient (pazopanib)</b>                               | Utilisé pour le traitement du carcinome métastatique des cellules rénales.                                                                                           |
| <b>Votrient (pazopanib) (deuxième lettre d'intention)</b> | Utilisé pour le traitement du carcinome métastatique des cellules rénales.                                                                                           |
| <b>Xalkori (crizotinib)</b>                               | Utilisé pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules avancé (deuxième ligne).                                                                       |
| <b>Xalkori (crizotinib)</b>                               | Utilisé pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules avancé (première ligne).                                                                       |
| <b>Xarelto (rivaroxaban)</b>                              | Nouvelle indication pour le traitement des événements thromboemboliques veineux et la prévention de la thrombose veineuse profonde récurrente et embolie pulmonaire. |
| <b>Xarelto (rivaroxaban)<sup>†</sup></b>                  | Utilisé pour la prévention de l'AVC chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire et pour la prévention de la thrombose veineuse profonde.                 |
| <b>Xeljanz (tofacitinib)</b>                              | Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.                                                                                                            |
| <b>XigDuo (dapagliflozine/ metformine chlorhydrate)</b>   | Utilisé pour le traitement du diabète de type 2 mellitus.                                                                                                            |
| <b>Xolair (omalizumab)</b>                                | Utilisé pour le traitement de l'urticaire chronique idiopathique.                                                                                                    |
| <b>Xtandi (enzalutamide)</b>                              | Utilisé pour le traitement en première ligne du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (avant la chimiothérapie).                              |
| <b>Xtandi (enzalutamide)</b>                              | Utilisé pour le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration (après la chimiothérapie).                                                             |
| <b>Yervoy (ipilimumab)</b>                                | Utilisé pour le traitement de première intention du mélanome avancé métastatique ou non résécable chez les patients adultes.                                         |
| <b>Yervoy (ipilimumab)<sup>†</sup></b>                    | Utilisé pour le traitement de deuxième intention du mélanome métastatique ou non résécable chez les patients adultes.                                                |
| <b>Zaxine (rifaximine)</b>                                | Utilisé pour le traitement de l'encéphalopathie hépatique.                                                                                                           |
| <b>Zepatier (elbasvir grazoprévir)</b>                    | Utilisé pour le traitement de l'hépatite C (de génotype 1 et 4).                                                                                                     |
| <b>Zydelig (idelalisib)</b>                               | Utilisé pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique récidivante.                                                                                           |
| <b>Zykadia (ceritinib)<sup>*</sup></b>                    | Utilisé pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) exprimant la kinase du lymphome anaplasique (ALK-positif).                             |
| <b>Zytiga (abiraterone)</b>                               | Utilisé pour le traitement du cancer de la prostate.                                                                                                                 |

## 22 négociations ont pris fin sans qu'une entente puisse être conclue :

|                                       |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abilify (aripiprazole)</b>         | Utilisé pour le traitement de la schizophrénie et des troubles psychotiques apparentés.                                           |
| <b>Adempas (riociguat)</b>            | Utilisé pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.                                                               |
| <b>Brilinta (ticagrélor)</b>          | Utilisé avec l'acide acétylsalicylique pour prévenir les événements athérothrombotiques avec antécédents d'infarctus du myocarde. |
| <b>Butrans (buprénorphine)</b>        | Utilisé pour le traitement des douleurs persistantes d'intensité modérée.                                                         |
| <b>Byetta (exénatide)</b>             | Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.                                                                                  |
| <b>Campral (acamprosate calcique)</b> | Utilisé pour le maintien de l'abstinence alcoolique.                                                                              |
| <b>Caprelsa (vandétanib)</b>          | Utilisé pour le traitement du cancer médullaire de la thyroïde.                                                                   |
| <b>Daklinza (daclatasvir)</b>         | Utilisé pour le traitement de l'hépatite C chronique.                                                                             |

|                                                                   |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Invokamet (canagliflozine/<br/>chlorhydrate de metformine)</b> | Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.                                                                                               |
| <b>Kalydeco (ivacaftor)</b>                                       | Utilisé pour le traitement de la fibrose kystique avec la mutation G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, S549R, G970R ou R117H. |
| <b>Kevzara (sarilumab)</b>                                        | Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.                                                                                      |
| <b>Methadose (méthadone)</b>                                      | Utilisé pour le traitement de la dépendance aux opiacés.                                                                                       |
| <b>Mictoryl (propivéline)</b>                                     | Utilisé pour le traitement de l'hyperactivité vésicale.                                                                                        |
| <b>Opsumit (macitentan)</b>                                       | Utilisé pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.                                                                            |
| <b>Otezla (aprémilast)</b>                                        | Utilisé pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave.                                                                             |
| <b>Otezla (aprémilast)</b>                                        | Utilisé pour le traitement de l'arthrite psoriasique.                                                                                          |
| <b>Rosiver (ivermectin)</b>                                       | Utilisé pour le traitement de la rosacée.                                                                                                      |
| <b>Simponi (golimumab) IV</b>                                     | Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.                                                                                      |
| <b>Soliris (éculizumab)</b>                                       | Utilisé pour le traitement du syndrome hémolytique et urémique atypique (SHUa).                                                                |
| <b>Strensiq (asfotase alfa)</b>                                   | Utilisé pour le traitement hypophosphatasie.                                                                                                   |
| <b>Technivie (ombitasvir/<br/>paritaprèvir/ritonavir)</b>         | Utilisé pour le traitement de l'hépatite C de génotype 4.                                                                                      |
| <b>Victoza (liraglutide)</b>                                      | Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.                                                                                               |

\*\* Par négociations pancanadiennes qui ont pris fin, on entend toute négociation pour laquelle une déclaration d'intention (un document décrivant les termes de l'entente et les conditions d'inclusion à la liste) a été signée entre le gouvernement qui dirige la négociation et le fabricant OU laquelle a été fermée sans une déclaration d'intention.

† Les neuf premiers produits pharmaceutiques négociés par l'Alliance pancanadienne pharmaceutique.

\* Les négociations complétées depuis la dernière mise à jour du 28 février 2018.